

CONSENSO INFORMATO PER RISONANZA MAGNETICA
Ospedale F. Ferrari - Casarano U.O. di Radiologia - *Primario FF: Dr. P. Spagnolo*

N. Tel 0833 508484 (orari 12-13 e 17-19)
Da esibire al momento dell'esame

COGNOME NOME TEL..... PESO.....

SCHEDA PER ACCESSO: Per l'accesso alla sala RM è indispensabile sapere se il paziente è portatore di Pace-maker (anche compatibili) o altri tipi di cateteri cardiaci, Neurostimolatori, Derivazioni spinali o ventricolari, Elettrodi cerebrali, Sistemi di perfusione con reservoir impiantati, Clips aortiche, cerebrali, Pompe di infusione, Impianti per udito, Protesi ortopediche, Protesi di cristallino, dentarie, acustiche (*da rimuovere il giorno dell'esame*), Schegge metalliche (da lavoro, caccia, incidenti), Soffre di claustrofobia, di anemia falciforme. E' stato operato di

Non è consentito l'accesso a donne con gravidanza sospetta e le gravide sino al 3 mese (parlare col Radiologo)

CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI GADOLINIO: Può essere necessario somministrarle il mdc a giudizio del radiologo anche indipendentemente dalla richiesta formulata, in base alla situazione clinica ed anche al rapporto rischio/beneficio,.

Qualsiasi paziente deve perciò giungere, a digiuno da circa 4 h, con il consenso firmato dal medico curante e/o con esami di creatinina ed azotemia (effettuati entro 3 mesi dalla data dell'esame).

La firma del medico presuppone la conoscenza delle condizioni clinico/laboratoristiche del paziente, ed è richiesta solo per evitare l'inutile ripetizione di esami di laboratorio e la perdita di tempo nella formulazione della diagnosi radiologica, con il reinserimento dell'esame con mdc.

Queste precauzioni necessarie per l'esecuzione dell'esame RM, sono attuate per evitare l'insorgenza di NSF e di ritenzione cerebrale di Gadolinio.

Sono considerati pazienti a rischio quelli con:

- anamnesi sospetta per IR: (necessario il dosaggio recente della creatinina sierica e del GFR)
- storia clinica di IR, emodialisi, dialisi peritoneale, trapianto renale o in attesa di trapianto epatico (esami entro 1 mese dalla data della RM).
- Ipotetici cofattori di rischio: età (<2 aa, > 65 aa), diabete, uso di farmaci nefrotossici o eritropoietina, recente iniezione di Gd (1 sett), malattie immunitarie, grave sepsi, pregressa trombosi, chirurgia maggiore e vascolare.

Nonostante la sicurezza del farmaco si possono avere reazioni minori o avverse del tutto imprevedibili, indipendenti da dose, abilità ed esperienza del Radiologo.

Nei pazienti allergici, è poi necessario effettuare la terapia antiallergica (modulo allegato) interfacciandosi con il medico radiologo per prevenire o ridurre, ma non in via assoluta, gli effetti collaterali derivanti dalla sua somministrazione.

Firma Medico curante/reparto

ANAMNESI RADIOLOGICA:

PER IL PAZIENTE: Il paziente legga attentamente il seguente modulo di consenso all'esecuzione all'esame e lo firmi davanti al Radiologo esecutore, a cui può chiedere chiarimenti.

DICHIARO

- di essere stata/o informata/o esaurientemente ed in modo comprensibile sull'indicazione clinica, l'utilità, le modalità di realizzazione dell'esame RM da eseguire, e sull'uso e gli effetti collaterali e secondari dovuti al mezzo di contrasto
- di aver ricevuto risposta alle domande poste al medico.

Esprimo il mio consenso alla esecuzione dell'esame RM.

IN FEDE

Firma paziente (o esercente patria potestà)

Firma Radiologo Casarano, il

CONSENSO INFORMATO PER RISONANZA MAGNETICA
Ospedale F. Ferrari - Casarano U.O. di Radiologia - *Primario FF: Dr. P. Spagnolo*

N. Tel 0833 508484 (orari 12-13 e 17-19)
Da esibire al momento dell'esame

Preparazione antiallergica TC-RM ospedale Casarano

Consigliamo, in pazienti con riferita allergia a sostanze, a medicinali ed a mezzi di contrasto iodato o paramagnetico, un trattamento farmacologico preparatorio all'esame radiologico, che prevede l'uso di mdc per via endovenosa, allo scopo di ridurre e prevenire reazioni allergiche secondo lo schema successivo.

PREDNISONE (Deltacortene forte o generici)	2 cp da 25 mg ogni 6 ore, iniziando da 18 ore prima dell'esame
BILASTINA (Robilas o generici)	1 cp da 20 mg 1 ora prima dell'esame
OMEPRAZOLO (o similari)	2 cp da 20 mg 3 ore prima dell'esame

NOTA: E' importante che il paziente si interfacci, qualche giorno prima dell'esame, con il radiologo per poter valutare la probabilità o la necessità di effettuare la somministrazione di mdc e, quindi, di iniziare la terapia.

Si consiglia abbondante idratazione del paziente prima e dopo l'esame, per accelerare l'eliminazione del mdc per via renale, soprattutto nei casi di insufficienza renale ed epatica.

La preparazione resta intesa come sopra, salvo diverso parere del medico curante.