



INDICAZIONI MEDICHE E OSTETRICHE ALLA PARTOANALGESIA

- Obesità (BMI > 30)
- Preeclampsia/ ipertensione cronica e/o gestazionale
- Malattie cardiovascolari o respiratorie della madre
- Diabete mellito
- Travaglio indotto o stimolato
- Travaglio prolungato
- Travaglio dopo Pregresso TC
- Prematurità o ritardo di crescita intrauterina
- Macrosomia fetale, presentazioni anomale e presentazione occipito-posteriore
- Contrattilità uterina non coordinata
- Morte endouterina/ aborto terapeutico
- Rischio elevato di taglio cesareo urgente in corso di travaglio di parto in gravida con previsione di vie aeree difficili

CONTROINDICAZIONI ALLA PARTOANALGESIA

- Rifiuto della gravida
- Coagulopatie
- Piastrinopenia : conta piastrinica < 80.000/ ml o trend in calo
- Somministrazione di EBPM se: < 12 ore a dosaggi profilattici, < 24 ore a dosaggi terapeutici
- Somministrazione di ENF < 4-6 ore
- Infezioni della cute e/o dei tessuti circostanti al sito della puntura
- Presenza di tatuaggi nel sito della puntura senza aree di cute libera
- Ipovolemia non corretta
- Allergia nota ad anestetici locali o oppioidi
- Ipertensione endocranica
- Sepsi

EFFETTI INDESIDERATI

- Prurito
- Nausea e vomito
- Brivido
- Ritenzione urinaria
- Fallimento della procedura
- Riduzione della capacità motoria

COMPLICANZE PRECOCI

- Ipotensione
- Perforazione della dura madre
- Iniezione subaracnoidea di anestetici locali
- Iniezione intravascolare di anestetici locali
- Iniezione subdurale di anestetici locali
- Mancato blocco segmentario e blocco unilaterale
- Danno diretto del midollo o delle radici nervose

COMPLICANZE TARDIVE

- Cefalea post-puntura durale
- Ematoma spinale
- Infettive-Infiammatorie
- Lombalgia
- Turbe sensitivo-motorie, temporanee o permanenti