

## Allegato 2: MEOWS MATERNO-FETALE DI ACCETTAZIONE

COGNOME E NOME DELLA PAZIENTE: \_\_\_\_\_

### PUNTEGGIO DI PREALLARME OSTETRICO

Score	3	2	1	0	1	2	3
Temperatura		<35	35-36	36,1-37,7	37,8-38,3	≥ 38,4	
Pressione Sistolica	<70	71-80	81-90	91-130	131-139	149-169	>170
Pressione Diastolica			<45	46-89	90-99	100-109	>110
Frequenza cardiaca		<40	41-59	60-100	101-110	111-129	>130
Frequenza Respiratoria	<7			8-18	19-22	23-29	>30
Livello Coscienza		Agitazione Confusione		Vigile	Risponde agli stimoli vocali	Risponde agli stimoli dolorosi	Privo di coscienza
Perdite vaginali	Presenza significativa di meconio	Presenza non significativa di meconio	L.A. chiaro	Assenti	Ematiche lievi	Ematiche franche	Ematiche abbondanti
Contrazioni uterine	Presenza di premito	Presenti ogni 3 -5 '	Presenti ogni 10-15'	Assenti Sporadiche		Utero subcontratto	Iperono uterino
Movimenti fetali	Assenti	Ridotti		Avvertiti regolari			
Frequenza cardiaca fetale	<100		100-109	110-160	161-180		>180

La probabilità di deterioramento clinico è:

- **BASSA** se il punteggio è **INFERIORE A 2**
- **MEDIA** se il punteggio è **COMPRESO TRA 2 e 4**
- **ALTA** se il punteggio è **MAGGIORE DI 4**

In base ai valori di punteggio si applica il **corrispettivo monitoraggio**:

- **PUNTEGGIO < 2**: la rivalutazione può essere condotta **ogni 2 ore**
- **PUNTEGGIO = 2**: la rivalutazione deve essere condotta **ogni 30 min**
- **PUNTEGGIO > 2 E ≤ 4**: deve essere convocato il medico e la rivalutazione deve essere condotta **ogni 15 minuti (o più frequentemente qualora se ne valuti la necessità)**
- **PUNTEGGIO > 4**: deve essere allertata l'**ostetrica più esperta**. In attesa del **Medico convocato d'urgenza**, la paziente deve essere mantenuta sotto **stretto monitoraggio clinico e strumentale in continuo** (monitor multiparametrico per PA, FC, SpO2)

PUNTEGGIO MEOWS DI ACCETTAZIONE ASSEGNATO: \_\_\_\_\_

ORA DI ACCETTAZIONE: \_\_\_\_\_

FIRMA OSTETRICA: \_\_\_\_\_

FIRMA MEDICO GINECOLOGO: \_\_\_\_\_