

AGGIORNAMENTO PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO AZIENDALE DEL 28 - Febbraio-2013

Classificazione ATC Anatomica/Terapeutica/Chimica	Principio attivo	Formulazione/ Dosaggio	Classe SSN	Nota AIFA	Ricetta	PHT	Note PTR
B	SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI						
B01AF							
B01AF02	Apixaban	os	A	RNLR	SI		
	<i>Apixaban</i>	Cpr Riv 2,5 mg	A	RNLR	SI		
B03AC	Ferro trivalente, preparati parenterali						
B03AC01	Carbossimaltoso ferrico	endov.		C-OSP			Solo per pazienti con scompenso cardiaco o dializzati che non possono accedere ad altre terapie mazionali alternative per effetti collaterali che dovranno essere adeguatamente documentati dai prescrittori.
	<i>Carbossimaltoso ferrico</i>	Inf fl 2 ml 50 mg/ml		C-OSP			
	<i>Carbossimaltoso ferrico</i>	Inf fl 10 ml 50 mg/ml		C-OSP			
C	SISTEMA CARDIOVASCOLARE						
C02KX	Altri ipertensivi						
C02KX04	sildenafil	os	H		RNM		Ipertensione arteriosa polmonare classe III OMS
	<i>sildenafil</i>	Ev fl 20 ml 0,8 mg/ml	H		RNM		
L	FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI						
L01XE	Inibitori delle protein chinasi						
L01XE09	Temsirolimus	ev	H,OSP				Monitoraggio AIFA. E' indicato nel trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule mantellari refrattario e/o recidivante (MCL).
	<i>temsirolimus</i>	ev fl 30 mg	H,OSP				
L04AB	Inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-alfa)						
L04AB01	Etanercept	sc	H,OSP		RNM		Farmaco inserito in PTOR per: 1. artrite reumatoide (in fase attiva negli adulti quando la risposta a DMARDs, metotrexato incluso, è risultata inadeguata e grave attiva e progressiva negli adulti in precedenza non trattati con metotrexato) limitatamente alle Reumatologie individuate per il Progetto Antares; 2. trattamento della spondilite anchilosante severa, in fase attiva in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale limitatamente alle Reumatologie individuate per il progetto Antares; 3. artrite psoriasica in fase attiva e progressiva negli adulti, quando la risposta ai DMARDs è risultata inadeguata, previa compilazione della scheda di monitoraggio prevista dalla Regione limitatamente alle Reumatologie individuate all'interno del progetto Antares e alle Dermatologie. 4. Psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti che non hanno risposto, o presentano una controindicazione, o sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi ciclosporina, metotrexato o PUVA limitatamente ai centri individuati per il per il progetto Psocare. Indicazione pediatrica per il trattamento dell'artrite psoriasica pediatrica di tipo attivo.
	<i>etanercept</i>						
	<i>Etanercept</i>	sc fl 25 mg	H		RNM		
	<i>Etanercept</i>	sc fl 50 mg	H		RNM		
L04AB04	Adalimumab	sc	H		RNM		1-Artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severo in pazienti no responder ai (Desease ModifyingAnti-rheumatic Drugs) DMARDs. 2- Artrite psoriasica attiva a progressiva in pazienti adulti no responder ai DMARDs. 3-spondilite anchilosante in pazienti adulti con risposta inadeguata a terapia convenzionale. 4- Malattia di Crohn attiva grave in pazienti con risposta inadeguata a base di corticosteroidi e/o di un immunosoppressore. 5- Psoriasi cronica a placche di grado da moderato a severo nei pazienti no-responderad altri trattamenti . 6- Artrite giovanile poliarticolare idiopatica in adolescenti in età da 04 a 17 anni con risposta inadeguata a farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARDs).
	<i>adalimumab</i>	sc fl 40 mg	H		RNM		

M	SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO					
M04AA	Preparati inibenti la formazione di acido urico					
M04AA03	Febuxostat	os	A	91	RR	
	<i>febuxostat</i>	os 80 mg.	A	91	RR	
N	SISTEMA NERVOSO					
N01B	Anestetici locali					
N01BB	Ammidi					
N01BB04	Prilocaina cloridrato	iniett.,intratecale	C-OSP			
	<i>prolocaina cloridrato</i>	iniett. Fl 2% 5 ml	C-OSP			
N01BB52	Lidocaina associazioni					
	lidocaina/tetracaina	cer.transd.	C		RR	
	<i>lidocaina/tetracaina</i>	cer. 70 mg/70 mg	C		RR	
N02AA	Alcaloidi naturali dell'oppio					
N02AA55	Oxicodone cloridr.+Naloxone clor.	os	A		RNR	Si raccomanda che il suo impiego conforme alle indicazioni terapeutiche registrate rientri in specifici protocolli di terapia del dolore che prevedano l'uso di schede di valutazione obbligatorie ai sensi della L. 38/2010
	<i>Oxicodone cloridr.+Naloxone clor.</i>	Cpr 10 mg+ 5 mg R P	A		RNR	
	<i>Oxicodone cloridr.+Naloxone clor.</i>	Cpr 40 mg+20 mg R P	A		RNR	
	<i>Oxicodone cloridr.+Naloxone clor.</i>	Cpr 5 mg+ 2,5 mg R P	A		RNR	
	<i>Oxicodone cloridr.+Naloxone clor.</i>	Cpr 20 mg+ 10 mg R P	A		RNR	
N05AX	Altri antipsicotici					
N05AX13	Paliperidone	im	H		RNRL	Da impiegare nelle SPDC e nei CIM secondo le indicazioni riportate in scheda tecnica.
	<i>paliperidone palmitato</i>	1 sir. Im 50 mg	H		RNRL	
	<i>paliperidone palmitato</i>	1 sir. Im 75 mg	H		RNRL	
	<i>paliperidone palmitato</i>	2 sir. Im 100 mg	H		RNRL	
	<i>paliperidone palmitato</i>	3 sir. Im 150 mg	H		RNRL	
N07BC	Farmaci usati nella dipendenza da oppioidi					
N07BC04	Lofexidina cloridrato	os				Uso molto circostanziato del farmaco (SERT e Pronto Soccorso) a causa dello sfavorevole rapporto costo/beneficio.
	<i>Lofexidina cloridrato</i>	cpr riv. 0,2 mg	C-OSP			
S	ORGANI DI SENSO					
S01F	Midriatici e cicloplegici					
S01FA56	Tropicamide+fenilefrina clor.	inserto	C			
	<i>Tropicamide+fenilefrina clor.</i>	Inserto 0,28/5,4 mg	C		RR	
V	VARI					
V03AE	Farmaci per il trattamento dell'iperkaliemia ed iperpotassiemia					
V03AE02	Sevelamer	os	A		RNM	
	<i>Sevelamer carbonato</i>	Os Polv 60 Bust 2,4 G	A		RNM	
	<i>Sevelamer carbonato</i>	Cpr Riv 800 mg	A		RNM	