

	Principio Attivo	Formulazione/ Dosaggio	Classe SSN / note AIFA	Ricetta	PHT	Note PTR
A04AD12	<i>Fosaprepitant</i>					
	<i>Fosaprepitant</i>	os end.	H-OSP			Indicazione terapeutica: prevenzione della nausea in chemioterapia.
C02KX05	<i>Riociguat</i>					
	<i>Riociguat</i>	cpr.	A		SI	Indicazione Terapeutica: <b>a)</b> Ipertensione polmonare Tromboembolica cronica; sottoposta a monitoraggio AIFA con individuazione dei Centri (specialisti cardiologo, pneumologo, cardiocirurgo - Determinazione AIFA n.125/2015); <b>b)</b> Ipertensione arteriosa polmonare.
J04AK05	<i>Bedaquilina</i>					
	<i>Bedaquilina</i>	cpr.	H	RNRL		Indicazione Terapeutica: indicato negli adulti per la tubercolosi polmonare multiresistente. Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA (specialista infettivologo, pneumologo) già inserito con D.D.393/2014 in quanto farmaco innovativo.
J05AE14	<i>Simeprevir</i>					
	<i>Simeprevir</i>	cps.	A		SI	Indicazione terapeutica: epatite C cronica. Specialità sottoposta a monitoraggio AIFA con individuazione dei Centri (specialisti medicina interna, gastroenterologo e malattie infettive Determina AIFAn.1638/2014).
J05AX15	<i>Sofosbuvir</i>					
	<i>Sofosbuvir</i>	cpr.	A		SI	Indicazione terapeutica: trattamento epatite C cronica. Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA (specialista internista, gastroenterologo, infettivologo).
L01CD01	<i>Paclitaxel-Albumina</i>					
	<i>Paclitaxel-Albumina</i>	end.	H-OSP			Indicazione terapeutica: in associazione
L01XC02	<i>Rituximab</i>					
	<i>Rituximab</i>	sott.	H-OSP			Indicazione terapeutica: Linfoma non
L01XE13	<i>Afatinib</i>					
	<i>Afatinib</i>	cpr.	H	RNRL		Indicazione terapeutica: trattamento
L01XE23	<i>Dabrafenib</i>					
	<i>Dabrafenib</i>	cps.	H	RNRL		Indicazione Terapeutica: trattamento del melanoma. Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA (specialista Oncologo).
L01XE24	<i>Ponatinib</i>					
	<i>Ponatinib</i>	cpr.	H	RNRL		Indicazione terapeutica: trattamento cancro della prostata metastatico. Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA.
L02BB04	<i>Enzalutamide</i>					
	<i>Enzalutamide</i>	cps.	H	RNRL		Indicazione terapeutica: trattamento leucemia mieloide acuta. Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA (specialista oncologo, urologo).
L04AA25	<i>Eculizumab</i>					
	<i>Eculizumab</i>	fl.end.	H-OSP			Indicazioni terapeutiche: trattamento emoglobinuria parossistica notturna, sindrome emolitica uremica atipica. Determina AIFA 1553/2014.
L04AB02	<i>Infliximab</i>					
	<i>Infliximab</i>	fl.end.	H-OSP			Determina AIFA 823/2014 (N.B. disponibilità Biosimilare)
L04AB06	<i>Golimumab</i>					
	<i>Golimumab</i>		H	RRL		Indicazione terapeutica: colite ulcerosa, artrite reumatoide, artrite psoriasica e spondilite anchilosante. Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA (specialista gastroenterologo, internista, reumatologo) già presente in PTOR con Determinazione AIFA n.20/2015 inserito nella piattaforma web.
L04AC07	<i>Tocilizumab</i>					
	<i>Tocilizumab</i>	soluz. per inf. sottoc.	H	RRL		Indicazione terapeutica: artrite reumatoide in associazione con Metrotexato. Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA (specialista reumatologo, internista).
L04AC08	<i>Canakinumab</i>					

	<i>Principio Attivo</i>	<i>Formulazione/ Dosaggio</i>	<i>Classe SSN / note AIFA</i>	<i>Ricetta</i>	<i>PHT</i>	<i>Note PTR</i>
	<b>Canakinumab</b>	<b>polv.sol.in.</b>	<b>H</b>	<b>RR</b>		Comunicato AIFA dell'8/01/2015. Indicazione terapeutica: sindromi periodiche associate a criopirina (CAP5) in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 2 anni di età con peso corporeo pari o superiore a 7,5 kg, comprese: Sindrome di Mukle-Wells (MWS); malattia infiammatoria multisistemica ad esordio neonatale (NOMID); Sindrome cronica infantile neurologica, cutanea, articolare (CINCA); gravi forme di sindrome familiare autoinfiammatoria da freddo (FCAS); orticaria familiare da freddo (FCU) che si manifestano con segni e sintomi oltre a rash cutaneo orticarioide indotto da freddo. Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA.
<b>L04AX04</b>	<b>Lenalidomide</b>					
	<b>Lenalidomide</b>	<b>cps.</b>	<b>H</b>	<b>RNRL</b>		Indicazione terapeutica: anemia trasfusionale dovuta a sindrome mielodipastica. Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA (specialista oncologo, internista, ematologo) già inserito con DD 393/2014 in quanto farmaco innovativo.
<b>N07XX08</b>	<b>Tafamidis Meglumine</b>					
	<b>Tafamidis Meglumine</b>	<b>cps.</b>	<b>H</b>	<b>RRL</b>		Indicazione terapeutica: trattamento dell'amiloidosi da transtiretina nei pazienti adulti affetti da polineuropatia sintomatica di stadio 1 al fine di ritardare la compromissione neurologica periferica. Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA (specialista internista, neurologo, cardiologo). Determina AIFA 1389/2014.
<b>N07XX09</b>	<b>Dimetilfumarato</b>					
	<b>Dimetilfumarato</b>	<b>cps.</b>	<b>A</b>		<b>SI</b>	Indicazione terapeutica: sclerosi multipla. Nota AIFA 65.
<b>S01LA05</b>	<b>Aflibercept</b>					
	<b>Aflibercept</b>	<b>soluz. Intrav.</b>	<b>H-OSP</b>			Indicazione terapeutica: edema maculare diabetico. Specialità sottoposta a monitoraggio AIFA con individuazione dei Centri.