

Scheda per la valutazione del dolore

Dati del paziente

Nome _____

Cognome _____

Data di nascita ____/____/____ Sesso M F


Data ____/____/____

Diagnosi

Scala FLACC - neonati e bambini sotto i 3 anni

	0	1	2
Volto	Espressione neutra o sorriso	Smorfie occasionali o sopracciglia corrugate, espressione distaccata, disinteressata	Da frequente a costante aggrottamento delle sopracciglia, bocca serrata, tremore del mento
Gambe	Posizione normale o rilassata	Si agita, è irrequieto, teso	Scalcia, o raddrizza le gambe
Attività	Posizione quieta, normale, si muove in modo naturale	Si contorce, si dondola avanti e indietro, teso	Inarcato, rigido o si muove a scatti
Pianto	Assenza di pianto (durante la veglia o durante il sonno)	Geme o piagnucola, lamenti occasionali	Piange in modo continuo, urla o singhiozza, lamenti frequenti
Consolabilità	Soddisfatto, rilassato	E' rassicurato dal contatto occasionale, dall'abbraccio o dal tono della voce, è distraibile	Difficile da consolare o confortare

Bambino di età > 3 anni: scala di Wong-Baker



SCALA NRS A 11 punti per la MISURAZIONE DEL DOLORE (adulto)

Nessun dolore Peggior dolore immaginabile

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



	DATA / /			DATA / /			DATA / /		
	08	15	21	08	15	21	08	15	21
NRS									
Fc									
Pa									
Fr									
SpO2									
Sedazione									
Cefalea									
Nausea									
Vomito									
Altro									
Firma									

RESCUE DOSE

	Farmaco e.v.	Anestetico locale	Altro
Data / /			
Data / /			
Data / /			
Data / /			
Data / /			

	Avvisato Medico reparto	Avvisato anestesista
Data / /		
Data / /		
Data / /		
Data / /		
Data / /		