



KETAMINA E ANALOGHI

La **ketamina** è una molecola di origine sintetica dalle **proprietà anestetiche ed analgesiche** ed è ampiamente utilizzata in ambito veterinario, molto meno come anestetico nell'uomo.

Nel mercato illecito si trova sotto forma di liquido, capsule e polvere cristallina. La *ketamina* è stata rilevata anche in compresse vendute come ecstasy o come adulterante di altre droghe quali cocaina, amfetamine, eroina.

Nell'uso non medico, la ketamina in polvere viene principalmente assunta per via inalatoria, o iniettata per via intramuscolare dopo averla portata in soluzione. Viene riportata anche l'assunzione per via orale, rettale o anche attraverso il fumo, in via endovenosa o intramuscolare.

Effetti e rischi

Secondo quanto riportato da alcuni consumatori, gli effetti possono comparire tardivamente quando assunta per sniffing, inducendo l'assuntore al consumo di dosi ripetute a breve distanza.

La durata dell'effetto è molto variabile. Per prolungare gli effetti ricercati, spesso viene assunta con allucinogeni (ad esempio, LSD) o amfetamine/amfetamino-simili.

Gli **effetti prodotti** dall'assunzione di tale sostanza sono: *allucinazioni, senso di dissociazione, immobilità, incoordinazione motoria, amnesia, disturbi visivi, cecità transitoria e ipotermia, torpore con la perdita delle nozioni di tempo e spazio*. Con una dose più alta, viene meno la sensibilità del corpo, con un senso di separazione tra corpo e mente che può causare depressione respiratoria, perdita totale della coscienza o coma.

Vengono riportati anche, come effetti "non ricercati", *deprivazione sensoriale, derealizzazione e stato dissociativo prolungato* (genericamente descritti come esperienze di pre-morte o "near-death").

Un analogo derivato della ketamina è la **metossietamina**, i cui **effetti** ricercati e descritti dopo il consumo, sono: *euforia, aumento dell'empatia, intensificazione delle esperienze sensoriali, distorsione del senso della realtà, allucinazioni visive vivide e persistenti*. Alcuni consumatori riportano di aver manifestato *nausea, vomito, diarrea, paranoia, ansia, confusione mentale, vertigini, distorsione del tempo, afasia, sinestesia, grave agitazione psicomotoria, insufficienza renale acuta e rabdomiolisi* (rottura delle cellule del muscolo scheletrico e rilascio nel flusso sanguigno delle sostanze contenute nel muscolo).

Ogni individuo ha dentro sé le risorse necessarie per attuare un cambiamento!

Le nostre équipes multidisciplinari specializzate sono a tua disposizione per *informazioni, prevenzione, cura e riabilitazione.*

Il servizio è ad **accesso diretto e gratuito**, non è necessaria la ricetta medica, gradita la prenotazione telefonica. **0997786214** Su richiesta si può accedere in **anonimato**.

SCRIVI AI NOSTRI SPECIALISTI

info.dipendenze@asl.taranto.it

Il Ser.D. Taranto è ubicato in via Ancona

Orari di Apertura al Pubblico

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 8,00 alle 13,00

martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00