

**STUDI CLINICI ATTIVI AL 05.10.2018 PRESSO L'ONCOLOGIA MEDICA
TORACICA DELL'ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" DI BARI**

CA 209-816

NEOADIUVANTE

(NIVOLUMAB + IPLIMUMAB/ DOPPIETTA CHEMIOTERAPICA/ NIVOLUMAB + DOPPIETTA CHEMIOTERAPICA)

Pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) allo stadio iniziale IB, II e IIIA (N2)

CACZ885T2301

ADIUVANTE

(CANAKINUMAB)

Pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio II-IIIa e IIIB completamente resecato (R0)

BR31

ADIUVANTE

(MEDI4736= ANTI-PDL1)

Terapia adiuvante in pazienti con NSCLC completamente asportato in stadio IB, II o IIIA

ADAURA

ADIUVANTE

(OSIMERTINIB)

Pazienti con NSCLC in stadio IIIB-IV con positività alla mutazione T790M del recettore EGFR

MP-LALC

MANTENIMENTO con immunoterapia

(PEMBROLIZUMAB)

Pazienti con NSCLC in stadio IIIA-B non operabile sottoposti a trattamento chemo-radiante ad intento curativo

MK 3475-789

SECONDA LINEA

(PEMBROLIZUMAB 200 MG + PEMETREXED 500 MG/M2 + CARBOPLATINO AUC 5 OPPURE CISPLATINO 75 MG/M2, SEGUITI DA PEMBROLIZUMAB 200 MG + PEMETREXED 500 MG/M2 SEGUITI DA TERAPIA DI MANTENIMENTO CON PEMETREXED)

Pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico con mutazione EGFR e resistenza ai TKI

EDEN-GOIRC

SECONDA LINEA

(NIVOLUMAB/ MIGLIORE TERAPIA DI SUPPORTO E A PROGRESSIONE NIVOLUMAB)

Pazienti affetti da NSCLC avanzato ad istologia squamosa in stadio IIIB-IV o recidivato

OSE2101

SECONDA O TERZA LINEA

(HLA-A2 positive patients)

Pazienti HLA-A2 positivi con NSCLC in stadio IIIB (inadatti per radioterapia) o IV

CABinMET

SECONDA O TERZA LINEA

(CABOZANTINIB)

Pazienti affetti da NSCLC in stadio IIIB-IV con deregolazione di MET

P-FROST

SECONDA O TERZA LINEA

(PF-06463922)??

Pazienti con NSCLC ROS-1 traslocato, pretrattati con Crizotinib

OSIRIS

TERZA LINEA

(OSIMERTINIB)

Pazienti affetti da NSCLC in stadio IIIB-IV EGFR mutato, T790M negativo

ESALATO

Valutazione dei composti organici volatili (VOC) nell'espriato di soggetti esposti ad asbesto ed in pazienti affetti da mesotelioma pleurico

NLRCPI

OSSERVAZIONALE

Rapporto neutrofili/linfociti in pazienti affetti da NSCLC in stadio IV in trattamento con checkpoints inhibitors

ALTERAZIONI MOLECOLARI NSCLC

OSSERVAZIONALE

Studio delle alterazioni molecolari in pazienti con nuova diagnosi di carcinoma polmonare NSCLC in stadio avanzato

TRANS-CPC

OSSERVAZIONALE

Studio retrospettivo sui carcinomi polmonari a piccole cellule diagnosticati in corso di trattamento per un altro carcinoma polmonare oncogene o non-oncogene addicted

EPIC

PRIMA LINEA ANZIANO FARMACOGENOMICA

Confronto tra chemioterapia standard ed immunoterapia in pazienti anziani affetti da NSCLC in stadio metastatico

ACC-LUNG

OSSERVAZIONALE

Validazione del pannello di geni Oncochip ACC Lung in pazienti con diagnosi di Tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato (IIIB-IV) non trattati o trattati con chemioterapia di prima linea

La SSD di Oncologia Medica per la Patologia Toracica consente di afferire ai seguenti farmaci

Brigatinib (in terza linea nei pazienti con traslocazione di ALK)

Durvalumab in mantenimento dopo chemioradioterapia negli stadi III

Rovalpituzumab Tesirine nei microcitomi in terza linea di trattamento

In fase di attivazione

ETOP 13-18 BEAT-meso

Uno studio multicentrico randomizzato di fase III che mette a confronto atezolizumab più bevacizumab e la chemioterapia standard rispetto a bevacizumab e la chemioterapia standard come trattamento di prima linea per il **mesotelioma pleurico maligno** di stadio avanzato

ETOP 12-17 ALERT-lung

Studio di fase II per valutare l'attività di Alectinib nei pazienti pretrattati con riarrangiamento di **RET**